Vue dans Rustica Aout 2011! ! !

La sensation contre les poux .....en exclusivité dans la boutique pro-élevage.com

La solution contre les poux ***rouge*** *et poux* ***noir et les poux de plu***
Les « DUTCHYS » 100% Bio et Naturelle. Fini les produit chimique.....
Gagnant du Grand Prix de l'invention 2010 aux Pays Bas.
Mode d'emploi général des Dutchy's ®
pour commander en ligne
www.pro-elevage.com

LES POUX ROUGES

Un ectoparasite Il existe plusieurs espèces de cette acariose dont le plus important est le Dermanyssus Gallinae.

Pour être précis le pou rouge est un arthropode de la classe des arachnides de l'ordre des acariens, du sous-ordre des mesostigma et de la famille des dermanyssidae. Mesurant de 0,5 à 2 mm à l'âge adulte, il est gris à jeun, rouge lorsqu'il se gave de sang et noir lorsqu'il a digéré, la larve est blanche transparente.
Acarien ectoparasite aviaire externe, temporaire et noctambule, il reste caché la journée dans des crevasses ou des fentes à proximité de son hôte et attaque la nuit en leur suçant le sang. Normalement il ne survit que temporairement sur les hommes et les mammifères mais les personnes en contact régulièrement avec les animaux infestés peuvent développer des irritations et des allergies suite à des piqures.
Attention danger Le pou rouge est un petit vampire qui s'installe aussi bien dans les poulaillers que les pigeonniers. Il attaque la nuit les animaux endormies, leur sucent le sang, puis se retire à nouveau.

Plus la moitié des élevages de poules seraient touchés par cet insecte en France. Aujourd'hui c'est le parasite externe le plus nuisible des élevages de volailles, Sa présence est un danger: Par ses piqûres répétées il provoque des anémies (diminution du nombre de globules rouges) qui peuvent être mortelles chez les jeunes

Porteur de bactéries pathogènes il peut inoculer des germes (salmonella) ou des parasites (plasmodium) et peut parfois s'attaquer à l'homme. Cela peut entraîner des diminutions de la ponte chez les poules ou anémie sévère chez les pigeonneaux.

Dans des conditions favorables de température et d'humidité, le cycle complet (œuf à œuf) du pou rouge n'excède pas une semaine, il est évident que la destruction de ce parasite n'est pas très simple d'autant plus qu'il est capable de rester pendant 8 mois sans se nourrir!

Compte tenue de sa rapidité de reproduction les infestations peuvent devenir rapidement très importantes (multiplication exponentielle). Par ailleurs, les poux rouges sont vecteurs de bactéries pathogènes (Salmonella, etc.) et de virus.
Comme tous les insectes qui se reproduisent très rapidement il y a potentiellement un risque que les poux rouges qui survivront aux traitement developpent une résitance à l'insecticide utilisé
Principales zones infestées Les poux rouges peuvent se cacher dans de nombreux endroits à l'abri de la lumière mais dans les plus calssiques vous avez :
Sous les fientes sur caillebotis Sous les cuvettes des pondoirs et crochets de fixation Dans les tubes des perchoirs Sous les barres de perchoirs de nids Il est évident que la destruction totale de la colonie est très difficile mais al'aide des DUTCHYS en peut arriver à maintenir une population de poux rouges à un niveau ZERO .

www.pro-elevage.com

REFONA®
Respect For Nature





REFONA Respect For Nature

Pro-elevage.com

En respecter la nature…..



Il existe sur le marché un nouveau produit révolutionnaire 100% Bio et Naturel contre les poux rouge et poux noir. « **Les Dutchys** »

Les Dutchys Se sont des petites bestioles qui se nourrissent de poux rouges et poux noirs.
Euro Select de www.pro-elevage.com est le fournisseur pour la France et les vend sous forme de petites boites, des Mite boosters et en grands doses dans des flacons de plusieurs tailles. Que l'on dispose dans sa pièce d'élevage ou dans les cages.

Le but étant le suivant.
Etant donné qu'ils sont friands de poux rouges et noirs, ceux-ci vont se propager dans la pièce à la recherche des indésirables et les exterminer.

Mode d'emploi général des Dutchy's ®

L'emploi des Dutchy's® contre les poux rouges doit se faire avec soin, suivez bien les instructions de ce mode d'emploi afin que cette éradication se déroule le plus efficacement possible. Les Dutchy's emploient durant les première semaines le substrat comme lieu de rencontre et de reproduction il est donc important qu'il reste en place quelques semaines et ne sèche pas.

Symptômes

Il est très important d'enrayer l'invasion des poux avant qu'elle ne devienne trop importante. N'attendez pas que vous oiseaux eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme en étant amorphes, en boule ou en maigrissant, pour cela il vous faudra contrôler régulièrement (1 fois par semaine) si vous avez des poux.

Le meilleur endroit pour poser les petits rouleaux de contrôle est sous les perchoirs et dans le support de Mite Booster. Prenez un bout de carton ondulé que vous roulez et place-les dans le Mite-Booster que vous attacherez avec des petites attaches. Les poux, qui le jour venu quittent le corps des oiseaux, s'y cacheront. Lorsque vous déroulerez le carton pour contrôler vous verrez le nombre de poux qui s'y seront caché ce qui vous donnera une idée de l'invasion. En fonction de leur nombre vous pourrez évaluer le nombre de Dutchy's® dont vous aurez besoin.



Instructions importantes lors du placement direct de flacon

1. Tenez la bouteille horizontalement et tournez la plusieurs fois afin que les Dutchy's® soient bien répartis.
2. Employez le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de Dutchy's® qu'il vous faut en fonction de votre invasion.
3. Versez un peu de substrat dans le bouchon et faites en un petit tas à l'endroit choisi
4. Laissez ce tas en l'état pendant 2 semaines. Chaque jours les Dutchy's® quitteront le tas pour aller à la chasse aux poux.
5. Employez tout le substrat car il ne se conserve pas longtemps, ils se mangeraient entre eux dans la bouteille.
6. Placez la bouteille vide minimum 1 jour dans la cage ou la volière. Les éventuels retardataires pourront s'en échapper.

Emploi des petits tapis

Il est important que le substrat reste humide, s'il sèche beaucoup de larves et d'œufs n'y survivront pas et l'effet sera moindre.
Mouillez les tapis et découpez-les. Chercher un endroit tranquille afin que tas ne soit pas dérangé par les oiseaux.
Recouvrez partiellement le tas avec une soucoupe reposant d'un côté sur un petit bout de bois afin de laisser un petit passage pour les Dutchy's

Emploi de petites boites en plastiques

L'emploi des boites est idéal en grande volières et dans les grands élevages. Vous pouvez les pendre aux perchoirs ou aux barreaux à l'extérieur de la cage ou les pendre dans les volières. Remplissez cette boite avec +/- 2 cm de terreau humide et ensuite mettez le « substrat » par dessus. Les Dutchy's® sortiront par le petit trou et se disperseront dans l'habitat des oiseaux. Versez-y régulièrement quelques gouttes d'eau par le petit trou afin que le tout reste humide au moins pendant 2 semaines. Si vous laissez ces petites boites plus longtemps les Dutchy's® se reproduiront surement dans le substrat.

Emploi dans les nids

Lorsque les poux sont présents dans les nids il est bien évident qu'il faudra placer les Dutchy's® dans les nids. Ecartez un peu la charpie, versez y un petit tas de « substrat » et recouvrez le de charpie, le nid est en principe un endroit assez humide mais si vous voyez que le substrat est trop sec n'hésitez pas à l'humidifier légèrement.

Emploi des Mite-boosters dans vos cages des oiseaux, les clapiers des rongeurs ou en dessous de perchoirs des volailles.

Très facile à fixes à l'utilisation des attaches livrée avec ou à visé par les trous prévu dans les Mite-Boosters.

www.pro-elevage.com

Ce qui peut arriver
Lorsque vous aurez placé des Dutchy's® dans vos élevages, il se peut qu'aux débuts, après quelques jours, vous découvriez (verrez) encore plus de poux, ceci est dû au fait que les poux sont pourchassés hors de leurs cachettes par les Dutchy's® et que peut être le fléau était plus étendu que vous ne le pensiez.
Les Dutchy's® vont continuer inlassablement à poursuivre les poux pour les manger ce qui fait qu'après un certain temps vous en verrez moins. Si après 3 semaines vous ne voyez pas d'amélioration, il sera nécessaire de recommander des Dutchy's® et d'en remettre.
En principe les Dutchy's® viendront à bout du fléau pour autant que vous leur en laissiez le temps et qu'ils soient en nombre suffisant.

Conservation
Lors de la livraison ils sont conditionnés dans un flacon en plastique avec une certaine quantité de « substrat » d'épandage. Il y a des flacons de 2500 unités (10 doses), 5000 unités (20 doses) et 10.000 unités (40 doses).
Les Dutchy's® se conservent quelques jours dans les flacons de livraison c'est pourquoi le bouchon est perméable et procure de l'air dans le flacon tout en empêchant les Dutchy's® de s 'échapper. Conservez les Dutchy's® au frais (**pas dans le frigo** – c'est trop froid) 10° est une température idéale. Une étiquette sur le flacon mentionne la date limite d'emploi. Mais il est conseillé de les utiliser dès réception.

NOUVEAU ! ! !……Emploi des « Mite-boosters+Quick Fixe » dans vos cages ou en dessous de perchoirs.
A fixes à l'utilisation des attaches livrée avec ou à visé.





Produits chimiques
Il est fortement recommandé d'éviter l'emploi de produit chimique (Oc pou ou autre produit chimique) avant ou après l'emploi des Dutchy's® – un délai de +/- 6 semaines doit être respecté après l'utilisation de ces produits avant d'épandage des Dutchy's® car ces produits chimiques ont un effet négatif sur leur développement et peuvent même contribuer à leur mort immédiate dès qu'ils entrent en contact avec les résidus de ces produits chimiques.

Dosage voir schéma

Eurl Euro Select
015 Rue Sombrero
66420 Le Barcarés
Attention ! Après quelques jours, vous découvriez (verrez) encore plus de poux, ceci est dû au fait que les poux sont pourchassés hors de leurs cachettes par les **Dutchy's®**
www.pro-elevage.com